



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی

بیماری تب کریمه کنگو (CCHF)

پرفش ویروس عامل بیماری

چرخه زندگی کنه



راههای پیشگیری از ابتلاء در شهروندان

- ۱- رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت.
- ۲- نگهداری لاشه حداقل به مدت ۲۴ ساعت پس از استحصال در اتاق سرد در کشتارگاه.
- ۳- خودداری از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی.
- ۴- خودداری از مصرف گوشت تازه سرد نشده (گوشت خریداری شده باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در یخچال ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و سپس مصرف شود)
- ۵- خودداری از مصرف جگر به صورت خام (جگر خریداری شده باید حداقل به مدت ۴۸ ساعت در یخچال ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد، نگهداری و سپس مصرف شود)
- ۶- استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منزل.



راههای پیشگیری از ابتلاء در دامداران

- ۱- خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها و عدم خرید گوشت لاشه های کشتار شده در خارج از کشتارگاه ها.
- ۲- اجتناب کودکان و روستائیان و دامداران از بازی و یا ملامسه کنه های ماده تخم ریزی کرده و
- ۳- خودداری از جدا و له کردن (کشتن) کنه ها توسط شیردوشان و دامداران.
- ۴- خودداری از پشم چینی دام ها، بدون استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده.
- ۵- اجتناب از استراحت در مراتع و کوهستان ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمنی.
- ۶- سمپاشی منازل و اصطبل های روستایی جهت کاهش جمعیت کنه ها.
- ۷- لازم به ذکر است که تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام است که نشانه در مانگای مشهودی در دام های آلوده ندارد و از این رو اقدامات دامپزشکی صرفاً به منظور تأمین بهداشت جمعیت انسانی و متعاقب گزارش وقوع بیماری در انسان، آغاز می شود.

